

Stroomschema Leghennen

Koppel

Vaccinatiestappenplan



Stroomschema Vleeskalkoenen

Koppel

Koppel vleeskalkoenen van tegen NCD gevaccineerde ouderdieren

Koppel vleeskalkoenen van **niet** tegen NCD gevaccineerde vermeerderingsdieren of niet gevaccineerd koppel ouder dan 18 dagen dat wordt verplaatst vanuit buitenland naar Nederlands bedrijf

Vaccinatiestappenplan

1) Vaccinatie door pluimveehouder, leeftijd 72 uur-18 dagen

Meteen na plaatsing vaccineren

2) Bloedonderzoek

- op leeftijd van 13 weken door dierenarts of paraveterinair
- 10 tot 20 dagen voor verplaatsing naar ander pluimveebedrijf (alleen voor koppels ouder dan 28 dagen)

Minimum weerstand

Van de 30 monsters heeft tenminste 83% titer ≥ 3 , tenzij koppel elke 6 weken door dierenarts is gevaccineerd met een levend vaccin. In dat geval moet tenminste 1 monster titer ≥ 3

Nee, dan eerstvolgende 2 koppels laten vaccineren door dierenarts

Minimum weerstand

Van de 30 monsters heeft tenminste 83% titer ≥ 3

Nee, eerstvolgende drie koppels laten vaccineren door dierenarts met:
1^e vacc. tussen 10-15 dagen
2^e vacc. tussen 28-35 dagen
3^e vacc. tussen 8-10 weken
alleen bij koppels hanen 4^e vacc. 16 weken

Ja, volgende koppel ga naar stap 1

Ja, volgende koppel ga naar stap 1



Stroomschema Vermeerderingsdieren

Koppel

Vaccinatiestappenplan



Stroomschema Vleeskuikens

Koppel

Vaccinatiestappenplan

